

イグザレルト® OD を服用される患者さまへ

この薬について

血液を固まりにくくし、
血栓ができるのを防ぐことで
脳梗塞を予防するお薬です
また血栓塞栓症の治療や
予防に使用することもあります

イグザレルトOD 10mg



イグザレルトOD 15mg




注意事項

1 飲み忘れに注意してください

飲み忘れた場合、2回分をまとめて一度に飲まないでください。飲み忘れに気付いた時はすぐに1回分を飲み、次回まで12時間以上空けて下さい。

飲み忘れに気がいたら…



2回分をまとめて飲まない

※静脈血栓塞栓症の場合は異なることがあります

2 この薬の服用中は血が止まりにくい状態になっています

けがをして出血した場合、血が止まるのに時間がかかりますので、出血したところをタオルなどで10分程度しっかり押さえてください。

ご注意ください!



ヒゲ剃りは電気カミソリで



歯ブラシは柔らかめ



鼻をかむときは優しく



ケガの恐れのある仕事や運動はなるべく避ける

3 下記の症状があらわれたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください



鼻や歯茎などから出血が続く



激しい頭痛、手足のまひ、ろれつが回らない、めまい

血尿や血便がでた



胸やけ、吐き気、むかつき



4 納豆・青汁・緑黄色野菜などの摂取制限はありません

この薬はビタミンKを豊富に含む食物の摂取制限はありません。

高血圧や糖尿病などの食事療法については主治医の指示を守ってください。

他の病院や歯科を受診したり、薬局などで市販薬やサプリメント、健康食品を購入する場合には、この薬を服用していることを伝えましょう